

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>	Título  <b>Escleroterapia</b>	Versão: 01
Elaborado por: Aldanea Silvestrin e Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar procedimento de escleroterapia.			
Setor: CEN – Sala de exame		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
<b>ETAPAS DO PROCEDIMENTO</b>			
<b>ESCLEROTERAPIA COM ADRENALINA</b>			
<b><u>Material:</u></b>			
2 seringas de 20ml;			
2 ampolas de adrenalina;			
2 agulhas 40x12;			
1 frasco de SF 0,9% de 125ml;			
2 agulhas de esclerose.			
<b><u>Diluição:</u></b>			
1 ampola de adrenalina (1ml) para 19ml de SF (1/19) = 20 ml solução.			
<b><u>Procedimento:</u></b>			
1. Acoplar a seringa à agulha de esclerose e preenche-la com a solução. Sobrará 18ml de solução para aplicação no paciente, 2ml preencherão a agulha;			

2. Auxiliar o médico na introdução da agulha no canal endoscópico, sempre mantendo a ponta da agulha recolhida;
3. Expôr a agulha quando o médico solicitar e injetar a solução, com a solicitação médica, contando quantos ml estão sendo injetados;
4. Parar a injeção e recolher a agulha conforme solicitação médica;
5. Preparar apenas uma seringa, caso o médico assistente solicite outra, fazer nova solução;
6. Ao final do procedimento, descartar a agulha em caixa de perfurocortantes e dar o destino adequado aos materiais.

### **ESCLEROSE COM ETANOLAMINA (ETHAMOLIN)**

#### **Material:**

- 2 seringas de 10ml (de preferência com bico Luer Lock);
- 4 ampolas de ethamolin;
- 2 ampolas de glicose 50%;
- 2 agulhas 40x12;
- 2 agulhas de esclerose.

#### **Diluição:**

Em uma seringa de 10ml aspirar primeiro 2 ampolas de ethamolin (4ml) e completar com 6ml de glicose 50%; (sempre aspirar primeiro o ethamolin e depois a glicose, se for ao contrário formará uma solução espumosa).

#### **Procedimento:**

1. Preencher a agulha de esclerose com a solução e administrá-la conforme orientação médica;
2. Seguir o procedimento de esclerose com adrenalina;
3. Sempre deixar 2 seringas de ethamolin preparadas.

### **ESCLEROSE COM ÁLCOOL ABSOLUTO**

#### **Material:**

- 5 seringas de 1ml;

5 agulhas 40x12;

Álcool absoluto;

2 agulhas de esclerose.

Não é realizada diluição da medicação.

**Procedimento:**

1. Aspirar álcool em todas as seringas e preencher a agulha de esclerose (é necessário 2 seringas de 1ml para preencher a agulha) ficando 3 seringas para o procedimento;
2. Seguir o procedimento de esclerose com adrenalina.