		ľ	Ц	
			4	
ι	JF	S	C	

ht	Procedimento Operacional POP Padrão (POP) Centro Endoscópico: Assistencial		NEPEN/DE/HU	
UFSC	Título Polipectomia	Versão: 01	Próxima revisão: 2016	
Elaborado por: Aldanea Silvestri	Data da criação: 06/2014			
Revisado por: Membros permane	Data da revisão: 10/08/2015			
Aprovado por: Diretoria de Enfe	Data da aprovação: 10/08/2015			
Local de guarda do documento: l	Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela Enfermagem	atualização: Membros permanen	ntes do NEPEN	e Diretoria de	
Objetivo: Orientar procedimento	de polipectomia			

Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem

MATERIAL:

Alça de polipectomia;

Setor: CEN – sala de exames

- Frasco com formol;
- Eletrocautério.

PROCEDIMENTO:

Retirar a alça da embalagem e auxiliar o médico na inserção no canal do endoscópio;

ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- Abrir e fechar a alça de acordo com a solicitação médica;
- Caso a retirada do pólipo seja a frio, estrangular o pólipo até seu deslocamento;
- Caso a retirada seja com cauterização, aguardar a passagem da onda elétrica pela alça para fechá-la;
- A coleta do pólipo poderá ser feita através de sucção do endoscópio ou através de pinças como de biópsia, basket, rede e catapólipos;
- Colocar a amostra em frasco com formol, identificar e protocolar;
- Ao final do procedimento, levar a alça e demais materiais para a sala de lavação.