

	Procedimento Operacional Padrão (POP) <u>Assistência de Enfermagem</u>	POP nº xx- DE/HU	
	Título Cuidados de Enfermagem na coleta de secreção vaginal/anal para pesquisa de <i>Streptococcus agalactiae</i> (beta hemolítico do grupo B)	Versão: 01	Próxima revisão: 08/03/2018
Elaborado por: Enfermeiras Silvana Benedet e Silvana Maria Pereira		Data da criação: 19/07/2014	
Revisado por: Membros permanentes do CEPEN		Data da revisão: 06/03/2017	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 08/03/2017	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP			
Responsável pelo POP e pela atualização: Enfermeiras Silvana Benedet e Silvana Maria Pereira			
Objetivos: -Padronizar condutas relacionadas às técnicas de coleta de secreção vaginal/anal para pesquisa de <i>Streptococcus agalactiae</i> (beta hemolítico do grupo B), realizada pelas enfermeiras, durante a consulta de enfermagem; -Aprimorar a segurança da paciente, minimizando erros na coleta de exames.			
Setor: Ambulatório de Tocoginecologia		Agente(s): Enfermeira	
<p style="text-align: center;">1. CONCEITO</p> Consiste na coleta de secreção vaginal e anal para pesquisa de <i>Streptococcus agalactiae</i> (beta hemolítico do grupo B) conforme preconizado em protocolo clínico para atenção pré-natal do HU-UFSC, cuja coleta deve ser realizada em mulheres que estão entre 35 e 37 semanas de gestação.			

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Maca ginecológica; Lençol de maca; Lençol de papel; Swab específico (Dracon); Meio de transporte de Amies.

3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Explicar para a mulher que o exame a ser realizado, no dia da consulta, pode gerar certo desconforto. Orientar sobre as coletas específicas, conforme requisição médica;
2. Posicioná-la na mesa ginecológica;
3. Preparar o material (swabs, meio de transporte de Amies);
4. Identificar o/os swabs com as iniciais, número de prontuário da mulher, com o tipo de secreção e horário de coleta;

5. Higienizar as mãos conforme técnica adequada;
6. Utilizar luvas de procedimentos como equipamento de proteção individual;
7. Realizar inspeção visual da vulva;
8. Afastar pequenos lábios com uma gaze e introduzir um único swab estéril e coletar secreção da região distal da vagina e após introduzir o swab em esfíncter anal e realizar coleta de secreção. Neste caso, um único swab contém secreção vaginal/anal. Pode ser inserido um swab para cada local de coleta;
9. Introduzir o swab no meio de transporte de Amies imediatamente;
10. Informá-la de que o exame acabou e que a mesma pode se arrumar;
11. Orientar a mulher sobre o encaminhamento para levar as amostras para o Laboratório de Análises Clínicas do HU-UFSC, agendar consulta para buscar os resultados e receber as orientações conforme necessidade de tratamento e seguimento;
12. Registrar as informações no prontuário da paciente.

4- REFERÊNCIAS:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFSC. Serviço de Análises Clínicas. Laboratório de Microbiologia. **Manual de coleta para exames microbiológicos.** Texto impresso.

TRAPANI JR, Alberto et al. Rotinas de Tocoginecologia do Hospital Dr Ernani Polydoro de São Thiago. Florianópolis: Hospital Universitário Dr Ernani Polydoro de São Thiago, UFSC, 2010.